



# **INFO-PRAIRIE Allier**



Programme Régional Autonomie Fourragère

Réseau pousse d'herbe - Bulletin n°12 - Semaine 19

# CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU <u>5 MAI 2019</u>

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2019		Prévision date 900°Cj 1er fév		2019		Prévision date 900°Cj 1er fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	795	752	12 mai	500 m alt. (calculé)	739	670	18 mai
MONTLUCON (231 m)	813	769	10 mai	ÉCHASSIERES (650 m)	733	638	18 mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	805	754	11 mai	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	568	526	(700°Cj) 22 mai
MONTBEUGNY (270 m)	834	754	9 mai	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	526	444	(700°Cj) 23 mai
Gain moyen depuis le 28 avril	66	82		Gain moyen depuis le 28 avril	47	67	

#### **CONSEILS DE LA SEMAINE**

# **Ensilages – Enrubannages:**

On atteint cette semaine les 900° C.jr, repère pour la récolte des ensilages et enrubannages pour les prairies intermédiaires. Les premiers épis apparaissent sur les parcelles suivies (hétérogène: les gelées ont retardé l'épiaison sur certaines prairies) : observer les parcelles pour évaluer l'avancement des stades et déclencher la récolte.

Remarque: Pour refaire du stock après l'ensilage ou enrubannage de méteil, il est possible de faire un RGI, un Moha, un Sorgho, ou un Maïs. Après une première coupe sur prairie, un apport de 30 à 40 unités d'N peut également favoriser la deuxième coupe (attention à l'équilibre fauche/pâture).

#### Pâturage:

La croissance de l'herbe devient « plus importante ». Elle atteint 60 – 70 kg MS/j, (supérieure à la moyenne 2008-2018, *cf graphique ci-contre*). Forte hétérogénéité liée: à l'état initial de la prairie, aux précipitations reçues et au gel. Pour éviter tout gaspillage :

- continuer le pâturage tournant : 3 à 4 parcelles au printemps et 40 50 ares / UGB.
- calculer le stock d'herbe sur pied et le **nombre de jours d'avance** (*Cf Info Prairie N° 11*) pour décider ou non de retirer une parcelle du tour. Au-delà de 10-15 jours d'avance, retirer une parcelle.

A la fin du 1<sup>er</sup> tour de pâturage : **faucher les refus** pour éviter l'égrainage du vulpin et des capselles bourses à pasteur et favoriser les repousses pour le tour suivant.

#### **METEILS FOURRAGERS**

Suivant l'objectif recherché, les stades de récolte diffèrent :


## - Fauche précoce = qualité:

Faucher avant d'avoir les épis pour garantir une bonne valeur alimentaire (énergie et azote).

# - Fauche plus tardive = quantité:

Faucher lorsque la céréale est au stade laiteux-pâteux permettra un maximum de rendement mais les valeurs alimentaires seront beaucoup plus faibles.

## Croissance décadaire de l'herbe



Bulletin réalisé par les conseillers fourrages et élevage de la Chambre d'Agriculture de l'Allier : Amélie Bouchant, Francis Bougarel et Nicolas Deux