

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 26 MAI 2019

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 1100°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1068	1048	14-juin	500 m alt. (calculé)	976	938	3-juin
MONTLUCON (231 m)	1070	1066	14-juin	ÉCHASSIERES (650 m)	965	903	4-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1068	1051	14-juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	765	761	10-juin (900°Cj)
MONTBEUGNY (270 m)	1100	1048	13-juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	700	662	10-juin (900°Cj)
Gain moyen depuis le 19 mai	107	105		Gain moyen depuis le 19 mai	91	90	

QUELLES SOLUTIONS APRÈS UN MÉTEIL ENSILÉ OU ENRUBANNÉ ?

Les méteils ont été récoltés ou vont l'être dans les jours à venir (stade début floraison des protéagineux et légumineuses pour rechercher la qualité ou laiteux-pâteux de la céréale pour la quantité).

A la suite de ces méteils, il est envisageable d'implanter :

- **Maïs**,
- **Sorgho fourrager multicoupe**,
- **Moha** ou **Moha-Trèfle**,
- **Colza fourrager**.

Le choix se fera en fonction de vos besoins (fauche ou pâturage).

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage

La pousse de l'herbe reste très hétérogène (fonction de la conduite du pâturage, de la fertilisation, de la zone, ...). Sur les prairies suivies, elle atteint **40 à 50 kg MS/ha/j** (cf graphique), ce qui est inférieur à la pousse attendue à cette période (cf moyenne 2008-2018).

Calculer les jours d'avance, prévoir **25 à 30 jours d'avance** (cf Info Prairie N°11 du 30 avril).

Si moins de 25 jours d'avance :

- Revoir la composition des lots (décharger),
- Faire pâturer une parcelle prévue à la fauche si le stade n'est pas trop avancé,
- Diminuer la hauteur de sortie des paddocks (pas en dessous de 5 cm),
- Apporter 30 U d'N sur les parcelles déjà pâturées (en fonction des pluies annoncées).


Si plus de 30 jours d'avance :

- Faucher le plus vite possible le paddock à débrayer,
- Revoir la composition des lots,
- Augmenter la hauteur de sortie des paddocks (au maximum 7 cm).

Fauche

Certaines parcelles ayant été fauchées en ensilage ou enrubannage début mai, devraient pouvoir être intégrées dans le pâturage. Pour favoriser les repousses, un apport de 30 unités d'azote peut être envisagé avant les pluies...

EVOLUTION DE LA POUSSE DE L'HERBE



- Diminution de la pousse de l'herbe (variable selon état initial des prairies et pluviométrie).
- Une pousse de l'herbe inférieure à la production moyenne.