

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 9 JUI 2019

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)



Réussir l'implantation  
et la conduite de ses prairies  
(1,5 jours)

25 juin (1 j) et 9 juillet (0,5 j) à Lapalisse  
OU

26 juin (1 j) et 11 juillet (0,5 j) à Villefranche

- Choix des espèces et variétés.
- Maîtrise de la chaîne de récolte.
- Intégration de fourrages riches en légumineuses dans les rations.
- Partage d'expérience avec un éleveur

Inscrivez-vous au 04.70.48.42.42 !

#### Plaine (< 500 m)

#### Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)

ANNEE	Plaine (< 500 m)			Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 1400°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 1400°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1286	1274	15-juin	500 m alt. (calculé)	1183	1153	22-juin
MONTLUCON (231 m)	1288	1294	15-juin	ÉCHASSIERES (650 m)	1167	1109	23-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1291	1280	15-juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	953	957	14-juil.
MONTBEUGNY (270 m)	1320	1275	13-juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	878	838	14-juil.
Gain moyen depuis le 2 juin	108	118		Gain moyen depuis le 2 juin	99	107	

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Fauche

Dans la plupart des situations, les foin sont maintenant bons à être faits : stade **floraison** des principales graminées. Attendre plus ne fera que diminuer les valeurs en énergie et protéines pour peu de quantité en plus.


Pour les **prairies riches en légumineuses** (à base de trèfle ou de luzerne), les **2<sup>èmes</sup> coupes** doivent être faites environ **6 semaines après la 1<sup>ère</sup> coupe** pour un optimum quantité – qualité. Pour ceux d'entre vous qui avaient fait les 1<sup>ères</sup> coupes fin avril – début mai : prévoir les 2<sup>èmes</sup> coupes dès maintenant.

#### Pâturage

La **pousse** reste très **hétérogène** selon les secteurs. Continuer de faire tourner sur 4 à 5 parcelles minimum et agrandir avec les parcelles fauchées mi-mai (chargement à prévoir en été ≈ 70 – 80 a/ÉVV).

Profiter de la faucheuse attelée pour **faucher les refus un jour ensoleillé** (ne pas couper trop bas pour ne pas pénaliser les repousses). Laisser les animaux un jour de plus, car une fois secs, les refus pourront être ingérés.

### PLUVIOMETRIE DU MOIS DE MAI



Sur le mois de mai : 30 à 40 % de la pluviométrie moyenne.  
Depuis le début de l'année : 50 à 60 % de la pluviométrie moyenne.