


Herbe et Fourrages BULLETT 9

12-avr-21



Station automatique météo-France	somme des températures en °C base 1er février	niveau de remplissage des Réserves Utiles en eau		
		sol RU 45 mm	sol RU 75 mm	Nombre de jours de pousse permis sans stress hydrique
AUBUSSON	464	24%	33%	4
AUZANCES	447	22%	37%	4
BENENVENT	547	32%	41%	5
BOURGANEUF	518	30%	44%	5
BOUSSAC	488	16%	27%	3
CHAMBONCHARD	497	11%	19%	2
LA COURTINE	380	25%	41%	4
FELLETIN	491	21%	36%	3
GENOUILLAC	501	16%	20%	3
GENTIOUX	425	44%	61%	7
LASOUTERRAINE	566	8%	20%	1
SAINT LOUP	500	9%	20%	2

Des conditions très peu favorables à la pousse de l'herbe.

Les gelées matinales répétitives handicapent la disponibilité en herbe sur pied, mais c'est surtout le manque d'eau qui est préoccupant. Les faibles précipitations de fin de semaine dernière ont ré humecté les sols en surface et n'autorisent dans le meilleur des cas qu'une semaine de pousse (sans pluie).

Cependant, les graminées captent les cumuls de températures qui font évoluer leur stade végétatif. Sachant que le stade « épi à 5 cm » est atteint vers 500-550°C, il est impératif de cesser le déprimage quand ce niveau est atteint.

moins

pâturage d'au moins 2 paddocks de la SB

fin du déprimage

stade

épis 5

cm





paddock de la Surface de Base. A partir de 500°C, cesser le

A partir de 500°C, cesser le déprimage

Entre 300°C et 400°C, pâturer

Le niveau de croissance de l'herbe ne permet pas de nourrir la totalité des troupeaux uniquement sur les prairies, il est conseillé de continuer à faire tourner les lots déjà à l'herbe et de différer la mise à l'herbe des lots encore en bâtiment.

Pour ne pas handicaper les rendements en foin, il est impératif de cesser le déprimage des parcelles à faucher pour éviter l'étêtage (consommation des épis en montaison) avec une perte de moitié des rendements espérés.

Cette année, ce sont les prés de fonds qui sont le moins impactés par les mauvaises conditions climatiques, et c'est là que se trouve de l'herbe sur pied. Il est judicieux de les mettre à la pâture plus tôt que d'habitude car la portance est bonne.

Contact: Hervé FEUGERE Chambre d'Agriculture de la CREUSE 05 55 61 50 06 ou 06 60 57 30 72

herve.feugere@creuse.chambagri.fr







