


### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 30 mai 2021

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2021	Moyenne 2009-2020	Prévision date 1400°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2021	Moyenne 2009-2020	Prévision date 1100°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	<b>1064</b>	1129	18-juin	500 m alt. (calculé)	<b>971</b>	992	7-juin
MONTLUCON (231 m)	<b>1058</b>	1146	19-juin	ÉCHASSIERES (650 m)	<b>947</b>	983	9-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	<b>1070</b>	1133	18-juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	<b>773</b>	745	27-juin
MONTBEUGNY (270 m)	<b>1103</b>	1134	16-juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	<b>719</b>	731	27-juin
<i>Gain moyen depuis le 23 mai</i>	<b>99</b>	108		<i>Gain moyen depuis le 23 mai</i>	<b>85</b>	95	

### PLUVIOMÉTRIE DE MAI (mm)



→ La pluviométrie du mois de mai est conforme à la moyenne des 10 années passées.  
→ Le cumul de pluie depuis le début de l'année atteint 82 à 97 % des cumuls moyens des 10 dernières années.

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Pâturage : pousse 55 à 80 kg MS/j/ha

Maintenir le chargement ou l'augmenter si nécessaire (cf IP 15 et 16).  
**Faucher les parcelles débrayées** du pâturage (rappel : si + de 25 j d'avance et hauteur d'herbe > 15 cm). Après, il sera trop tard pour la faucher et bénéficier des repousses.  
Si présence de refus, profiter que les faucheuses soient attelées : une journée avant de sortir les animaux afin qu'ils les consomment, faucher les.

#### Fauches

La fenêtre météo de la semaine dernière a permis de nombreuses récoltes. Pour beaucoup, la quantité est au rendez-vous, et la qualité sera sans doute correcte mais hétérogène car les températures plus fraîches ont ralenti l'avancée des stades. Si certaines parcelles avancées n'ont pu être récoltées : prévoir une récolte en foin (rapport qualité/prix).

⚠ Prévoir le début des foins pour les parcelles productives et précoces mais attention à l'humidité dans les sols qui pénalise le séchage (cf encadré).

Attendre pour les autres peut permettre de « mettre du pied » et gagner un peu en quantité.

Prévoir les secondes coupes des prairies fauchées en avril après les gelées (6-7 semaines après 1<sup>ère</sup> fauche).

### RÉCOLTES : QUELQUES PRÉCONISATIONS



✓ **Ne pas faucher trop bas : 6-7 cm** (8 cm pour la luzerne) → évite de pénaliser les repousses, de mettre de la terre dans le fourrage, et **facilite le séchage**.

✓ A chaque fourrage sa **matière sèche**

- Ensilage : **25 - 30 %**,
- Enrubannage : **50 - 55%**,
- Foin : **85 - 90 %**.

✓ 1<sup>er</sup> **fanage** énergétique dans les 2 h après la fauche, puis fanage(s) suivant(s) le matin avant disparition de la rosée surtout pour légumineuses plus fragiles.

✓ **Conservation**

- Ensilage : attention au tassage → brins 7-8 cm (si autochargeuse : limiter le temps de séchage)
- Enrubannage dans les heures qui suivent le pressage (luzerne et méteils : préférer les filets et doubler le film).