INFO-PRAIRIE Allier

Réseau pousse d'herbe - **Bulletin n°18** - *Semaine 23*

Programme Régional Autonomie Fourragère

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 6 juin 2021

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine *(< 500 m)*				Combraille et Montagne Bourbonnaise *(> 500 m)*			
ANNEE	2021	Moyenne 2009-2020	Prévision date 1400°Cj 1er fév	ANNEE	2021	Moyenne 2009-2020	Prévision date 1400°Cj 1er fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	**1181**	1243	18-juin	500 m alt. (calculé)	**1083**	1098	25-juin
MONTLUCON (231 m)	**1173**	1260	18-juin	ÉCHASSIERES (650 m)	**1059**	1087	27-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	**1187**	1248	18-juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	**876**	833	15-juil.
MONTBEUGNY (270 m)	**1219**	1249	16-juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	**817**	820	15-juil.
Gain moyen depuis le 30 mai	***117***	*114*		*Gain moyen depuis le 30 mai*	***107***	*100*	

PRAIRIE TEMPORAIRE 7/6/21

→ Prairie temporaire initialement prévue en enrubannage qui sera finalement fauchée en foin en raison de son stade avancé (fin épiaison - début floraison).

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : pousse 50 à 70 kg MS/ha/j

Les conditions sont « poussantes », cependant le pic de pousse n'a pas atteint le niveau des années précédentes. La gestion de l'herbe se fait donc à flux tendu, d'autant plus si l'agrandissement des surfaces à pâturer n'est pas possible en raison des fauches « précoces » faites fin mai seulement.
→ Maintenir l'organisation actuelle. (*cf IP 15 et 16*)

⚠ Dernier carat pour faucher les parcelles débrayées afin d'espérer des repousses et les réintégrer dans le pâturage.

Fauches

Prévoir le début des foins pour les parcelles productives et précoces mais attention « aux foins verts » et à l'humidité dans les sols qui pénalisent le séchage. (*cf encadré*)

STOP Enrubannage : Les stades ont beaucoup avancé ces dix derniers jours avec les températures plus élevées. → Pour un meilleur rapport qualité/coût : Récolter en foin ! *(cf photographie)*

Faire le point sur les besoins en pâturage et stocks. Réserver les parcelles fauchées en 1ères coupes au pâturage ou à des 2ndes fauches. Compte tenu de la date à laquelle nous sommes : si un apport d'azote était prévu (30 U d'N), le faire maintenant si prévision de pluie. Après il sera trop tard.

FOINS : QUELQUES PRÉCONISATIONS

✓ *Rappel : Ne pas faucher trop bas : **6 – 7 cm** (8 cm pour la luzerne)* → évite de pénaliser les repousses, de mettre de la terre dans les bottes, et **facilite le séchage**.

✓ Viser un taux de MS de **85 – 90 %**
- **75 % MS** = foin paraissant sec sauf sous les andains,
- **85 % MS** = foin craquant.

⚠ ***Séchage :***

→ 4 à 5 jours après avoir bottelé, vérifier la température :

- avec une **sonde de températures** : **si T<45 °C**, vous pouvez les rentrer,
- avec une **tige en acier** ou en **cuivre** laissée 1 h au centre de la botte : si elle est trop chaude pour être tenue quand vous la retirez, attendez pour stocker.

Bulletin réalisé par les conseillers fourrages et élevage de la Chambre d'Agriculture de l'Allier : Amélie Bouchant, Francis Bougarel et Vanessa Vozel.