

INFO-PRAIRIE Allier


Réseau pousse d'herbe - Bulletin n°19 - Semaine 24

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 13 juin 2021

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2021	Moyenne 2009-2020	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2021	Moyenne 2009-2020	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1307	1359	18 juin	500 m alt. (calculé)	1205	1212	25 juin
MONTLUCON (231 m)	1298	1376	18 juin	ÉCHASSIERES (650 m)	1180	1195	26 juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1313	1364	17 juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	990	931	15 juil.
MONTBEUGNY (270 m)	1345	1365	16 juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	928	913	14 juil.
<i>Gain moyen depuis le 6 juin</i>	126	119		<i>Gain moyen depuis le 6 juin</i>	118	109	

PRAIRIES RICHES EN LÉGUMINEUSES : QUAND RÉCOLTER LA 2^{ÈME} COUPE ?



Quelle que soit la date de la 1^{ère} coupe, prévoir la 2^{ème} coupe **6 à 7 semaines après la 1^{ère}**.

FOINS PAS SUFFISAMMENT SECS : QUELLES CONSÉQUENCES ? (SOURCE = WAHLEN ET GOERIN, APPF)

	Fermentation marquée	Fermentation excessive	Echauffement très élevé	
Caractéristique	Odeur de pomme pourrie	Foin brun Odeur de tabac ou café brûlé	Foin noir Odeur de roussi	
T°C atteinte	50 - 60	60 - 70	> 75	
Risque de % perte	valeur énergétique	5 - 15	15 - 30	30 - 40
	valeur azotée	10 - 30	30 - 80	100

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauches

Températures, soleil et stades (début floraison), enfin réunis, ont permis les récoltes des 1^{ers} foins : la quantité et la qualité semblent au rendez-vous. Dans certains cas, les fourrages sont versés sur pieds, ce qui complique la fauche (« faucher plus ras ») et à cette période, ils ne mettent qu'une semaine pour blanchir en pieds et perdre en valeurs.

Même si les fenêtres météo laissent des possibilités de récolte « confortables » : **vérifier la MS avant récolte** (85 % = « foin craquant ») pour éviter l'échauffement. Un foin qui chauffe engendre des risques d'incendie, des pertes de valeurs alimentaires et d'appétence (cf encadré ci-contre).

2^{èmes} coupes de fourrages riches en légumineuses ?

Pour ceux qui ont pu faucher fin avril - début mai : les 2^{èmes} coupes sont à prévoir dans les jours qui viennent (cf graphique ci-dessus).

Pâture

La gestion reste compliquée car les parcelles fauchées ces 10 derniers jours ne permettent pas encore de donner de souplesse aux prés pâturés au printemps. Tant que la faucheuse est attelée, faucher les refus tout en laissant les animaux les consommer peut permettre de « grappiller » 1 ou 2 j de pâture donc « un peu de souplesse ».