


### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 20 juin 2021

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)			Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2021	Moyenne 2009-2020	ANNEE	2021	Moyenne 2009-2020	Prévision date 1400°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	<b>1432</b>	1477	500 m alt. (calculé)	<b>1331</b>	1321	24-juin
MONTLUCON (231 m)	<b>1424</b>	1495	ÉCHASSIERES (650 m)	<b>1302</b>	1302	25-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	<b>1439</b>	1483	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	<b>1114</b>	1024	14-juillet
MONTBEUGNY (270 m)	<b>1471</b>	1482	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	<b>1053</b>	1007	12-juillet
Gain moyen depuis le 13 juin	<b>126</b>	119	Gain moyen depuis le 13 juin	<b>125</b>	105	

### CROISSANCE DÉCADEIRE DE L'HERBE

(kg MS/ha/j)



→ Le pic 2021 (50kg MS/ha/j) n'a pas atteint la moyenne 2008-2020,

→ Pousse d'herbe en phase descendante.

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Pâturage : phase descendante de la pousse

La pousse mesurée reste correcte (de 20 à 60 kg MS/ha/j) mais elle est dans la phase de décroissance (cf graphique). Calculer les jours d'avance (cf IP n° 15) :

**Si > 25-30 jours** Continuer l'organisation actuelle (35- 55 a/UGB selon le potentiel)

**Si < 25 jours** Intégrer les parcelles fauchées début mai afin de réduire le chargement, affourager si nécessaire + faucher les « refus » et faire manger pour gagner 1j ou 2 de pâturage

⚠ Attention au surpâturage ! A cette saison, un jour de plus est « le jour de trop » qui pourra fortement pénaliser la repousse.

Il est désormais trop tard pour débrayer une parcelle. Si toutefois un paddock a une hauteur d'herbe > 15 cm, faucher à 8 cm minimum et faire pâturer.

#### Fauches

Les 2<sup>èmes</sup> coupes sur les parcelles récoltées fin avril - début mai se poursuivent.

Concernant les légumineuses, prévoir 6 à 7 semaines de repousses. A cette saison, les récoltes peuvent être réalisées en foin (cf encadré).

### RÉUSSIR UN FOIN DE LÉGUMINEUSES



Ne pas brasser un fourrage en journée !

- Faucher à 8 cm afin de ne pas pénaliser la repousse et faciliter le séchage.
- Etaler au maximum le fourrage de suite après la fauche et prévoir un éventuel fanage supplémentaire en fonction de la quantité.
- Andainer le matin dans la rosée (feuilles humides et peu fragiles).
- Presser tôt le matin dès que la rosée s'est retirée ou le soir juste avant apparition de la rosée.



Remarques : Les pertes sont plus faibles en récoltant de gros andains. Le liage filet est préférable pour garder les feuilles.