

## Conseil collectif sur la production fourragère réalisé par les techniciens de la Chambre d'Agriculture 71 Outil de pilotage et d'aide à la décision pour les éleveurs

Rédaction : Véronique GILLES – vgilles@sl.chambagri.fr – Antoine BUTEAU – abuteau@sl.chambagri.fr

Sommes des températures cumulées	200°C (base janvier) Apport d'azote	300°C- 350°C (base février) mise à l'herbe	500°C à 550 °C fin déprimage épis 5 cm	700°C-800°C fauche précoce début épiaison	1000°C foin précoce début floraison	1200°C foin moyen floraison
----------------------------------	---	--	--	---	---	-----------------------------------



### Pas d'arrêt dans la pousse...

Station	Prairies Σ tpt° cumulée base février
Autun 300	227
Autun 400*	209
Autun 500*	191
Macon 200	254
Torcy	232
Saint Yan	247
Jalogny	228
Beaudemont 300*	235
Beaudemont 400	217
Mont St Vincent 600	201
Mont St Vincent 400*	237
Matour 400	226
Chalon	239
Varenne ST Sauveur	258
St Maurice les Couches	231

\* données recalculées (Météo France)

Malgré des prévisions de retour à des températures normales pour un mois de février, la semaine passée a encore cumulé entre 45 et 50 degrés !! Il faut se préparer à un lâcher plus précoce pour valoriser la pousse de l'herbe dans 15 jours à 3 semaines pour les exploitations peu chargées (voir commentaires ci-contre). Par contre, la pluviométrie se rattrape et nous sommes dans les moyennes décennales.

mai) généralement plus chargées : Dans ce cas, il est préférable d'avoir un peu d'avance à la mise à l'herbe. Prévoir 7 à 8 cm de hauteur d'herbe au lâcher.


➊ Pour les parcelles conduites plus extensivement, sans agrandissement avant l'été, il y aura constitution de stocks sur pied avec un risque de débordement et de perte de qualité. Une mise à l'herbe précoce entre 250 et 300° permettra de « brider » la pousse jusqu'à début mai et de constituer un stock sur pied de meilleure qualité, avec moins de montée en épis.

- L'estimation du stock sous les pattes des bêtes fin avril tout début mai. Trop d'herbe à ce moment génère du gaspillage et de la perte de qualité si elle n'est pas gérée.
- En pâturage tournant, les premières parcelles pâturées avant les 500° vont épier vers les 800-900°, il faut donc y retourner dans un délai de 25 jours si on veut éviter l'épiaison.

### Important : La surface de base ?

La surface de base est l'ensemble des surfaces de pâture attribué à un lot d'animaux sur la période avril-mai. Cela peut être une ou plusieurs parcelles contiguës ou pas. La gestion de cette surface pourra se faire en pâturage continu, tournant etc.

(Elle n'inclue pas le déprimage éventuel d'un foin.)



Les instants déterminants pour la gestion de la pâture sont :

➔ La date ou la hauteur d'herbe à la mise à l'herbe à définir, entre autre, selon les stratégies envisagées et le niveau de chargement par rapport au potentiel. Cette étape aura des conséquences importantes sur le comportement de la prairie dans les 6 à 8 semaines qui suivront, il ne faut donc pas la négliger :

➋ Pour les parcelles exploitées à flux tendu et peu de stocks sur pied car elles sont associées à un agrandissement en fin juin (parcelle avec fauche précoce de

### Se doter d'un outil de gestion de l'herbe :

➔ Quelle surface affectée au pâturage, 35, 45, 55 ares par UGB ? Cela dépend de nombreux facteurs. Cependant, un ajustement par rapport à vos pratiques habituelles peut être tenté sans prendre de risques. Pour cela, dans la mesure du possible, et en respectant votre nombre d'animaux par hectare habituel, affectez 5 parcelles à votre lot, ou réajustez votre lot pour 5 parcelles.

Cette « 5<sup>ème</sup> parcelle » représentera 15 à 20 % environ de votre surface totale (tout dépendra de la parcelle culturale). Si la pousse est bonne en avril-début mai, vous pourrez la court-circuiter pour la faucher mi-mai. Au contraire, si le pâturage vous semble trop tendu, vous la laisserez dans le pâturage et retrouverez votre surface totale habituelle.

Sur début avril, vous pourrez aussi jongler avec un peu de déprimage sur d'autres parcelles de fauche, pour prendre une petite avance sur votre surface de base en pâture.

La « 5<sup>ème</sup> parcelle » sera mécanisable pour pouvoir enrubanner en général autour du 15 mai afin de la retrouver en pâture en juin où elle sera probablement nécessaire. Ne pas la fertiliser et faire un léger pâturage fin mars dès la mise à l'herbe. Il faut qu'elle reste pâturable fin avril/début mai sans avoir à la gérer au fil...