

23 février 2022

Herbe Hebdo N°3

Conseil collectif sur la production fourragère à destination des élevages de Côte-d'Or

Les repères pour gérer les prairies

Somme de températures cumulées depuis le 1 ^{er} février (base 0°-18°)	200 - 220 °C *	300 - 350 °C	500 - 550 °C	700 - 800 °C	1000 °C	1200 °C	1400 °C	> 1400 °C
	Apport d'azote	Mise à l'herbe	Fin déprimage Epi 5 cm	Fauche précoce Epi 10 cm – Début épisaison	Foin précoce Début floraison	Foin moyen Floraison	Foin tardif médiocre Début grainage	Grainage



Semis de luzerne sous couvert de céréales de printemps

Dès fin février à début mars, vous pouvez planter vos luzernes sous couvert d'avoine ou d'orge de printemps. Privilégier l'avoine si vous comptez réaliser une coupe d'ensilage ou d'enrubannage du mélange en juin. Cette première coupe sera de meilleure qualité avec l'avoine plutôt qu'avec de l'orge.

Le semis sous couvert réduit le salissement de la luzerne et permet de réaliser une récolte supplémentaire dans l'année d'implantation.

Itinéraire technique : si vous n'avez pas de semoir à double caisson alors il faudra semer en premier la céréale (80 kg/ha d'avoine ou 100 kg/ha d'orge de printemps) à 2-3 cm de profondeur, puis rouler. Semer ensuite la luzerne à 1 cm de profondeur à une densité de 20 kg/Ha, si possible en croisé et rouler à nouveau.

Sommes de température et cumul de pluviométrie du 01 janvier au 20 février				
Station	Altitude	T° base janvier	T° base février	Cumul pluvio (mm)
SAVIGNY-LES-BEAUNE	246 m	205	121	78
TAVAUX (39)	195 m	201	121	64
CHAMBLANC-SEURRE	182 m	209	123	52
DIJON-LONGVIC	219 m	203	118	51
MONTBARD	209 m	232	125	99
SAINT-ANDRE (89)	300 m	223	127	88
POUILLY-EN-AUXOIS	412 m	188	112	72
JOURS-LES-BAIGNEUX	392 m	201	113	93
SEMUR-EN-AUXOIS	314 m	212	120	59
CHATILLON-SUR-SEINE	262 m	223	126	86
ARNAY-LE-DUC	390 m	184	111	75
TIL-CHATEL	283 m	172	105	58
SAULIEU	586 m	173	100	106
SAINT-MARTIN-DU-MONT	578 m	164	99	91

A partir des données de Météo-France

Les 200°C on y est !!!

Les 200° sonnent le moment optimal pour les apports d'azotes sur prairie au printemps. Ce seuil est atteint dans les zones précoces du département et devrait être franchi dans les prochains jours dans les zones plus tardives.

Les conditions météorologiques des prochains jours devraient permettre un bon ressuyage des sols mais peu de précipitations sont prévues. Il convient donc de se tenir prêt afin de placer l'apport au meilleur moment afin de concilier portance des sols, risque de volatilisation de l'engrais et précipitation à venir.

Vous pouvez retrouver sur le lien suivant un outil permettant d'estimer la date optimal du premier apport d'azote à partir de votre code postale.

<http://www.datenprairie.arvalis-infos.fr/>



Photographie du 09/06/21 d'une luzerne sous couvert d'avoine semé début mars 2021.

En cas de semis de luzerne pure, semez plutôt selon les conditions météorologiques entre le 15 mars et le 15 avril au plus tard, à une dose de 20 à 25 kg/ha.